

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah jurnal dari 3 jurnal dapat di Tarik sebagai berikut:

- 1) Pengkajian pada pasien tuberkulosis yaitu pasien mengeluh sesak napas, batuk berdahak disertai batuk berdarah, batuk di rasakan lebih dari 3-4minggu, tidak nafsu makan, demam, dan berkeringat di malam hari tanpa berkegiatan
- 2) Masalah keperawatan yang di angkat yaitu Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan Ansietas, Keletihan, Penurunan ekspansi paru.
- 3) Intervensi keperawatan menggunakan terapi non farmakologi yaitu SOP terapi posisi semi fowler.
- 4) Implementasi keperawatan yang digunakan adalah SOP terapi posisi semi fowler 30°-45° yang dilakukan selama 3 hari dalam 2x pertemuan setiap harinya atau Dilakukan selama 1x/mnt selama 2x sehari pagi dan sore.
- 5) Evaluasi keperawatan pasien tuberkulosis dengan penerapan terapi posisi semi fowler berdasarkan studi literatur terbukti efektif menurunkan sesak napas, keefektifan dari Tindakan tersebut dapat dilihat dari *respiratory rate* yang menunjukkan angka normal yaitu 16-24x/menit pada usia dewasa.

5.2 Saran

- 1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian pasien tuberkulosis melalui Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Oksigenasi Dengan Penerapan Posisi Semi Fowler Terhadap Respirasi Rate Pada Pasien Tuberkulosis: Literatur Review

2. Bagi Fikes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Diharapkan dapat menambahkan keluasan ilmu pengetahuan keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dan meningkatkan kemandirian pasien tuberkulosis dengan penerapan terapi posisi semi fowler.

3. Bagi penulis

Diharapkan untuk memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil *literatur review*, tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada pasien tuberkulosis.

