

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
Skripsi, September 2017

NURLAILA KODARIAH
C1420113069

HUBUNGAN INTENSITAS NYERI DENGAN KECEMASAN
PASIEN OSTEOARTRITIS DI PUSKESMAS URUG
KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK

xiii, 76 Halaman, VII Bab, 4 Tabel, 2 Bagan, 7 Lampiran

Osteoarthritis menyebabkan adanya abrasi rawan sendi dan adanya pembentukan tulang baru yang irreguler pada permukaan persendian sehingga menimbulkan nyeri yang bersifat kronis. Nyeri yang lama menyebabkan terganggunya fisik dan psikologis. Gangguan psikologis yang diakibatkan nyeri kronik adalah kecemasan ringan sampai dengan berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas nyeri dengan kecemasan pasien osteoarthritis di Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah metode *studi korelasional* dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Jumlah sampel sebanyak 51 orang dengan teknik *consequutive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan NPRS dan HARS. Hasil penelitian menunjukkan intensitas nyeri pasien osteoarthritis sebagian besar kategori ringan 28 (54,9%) dan sebagian kecil kategori sedang 23 (45,1%). Kecemasan pasien osteoarthritis sebagian besar kategori sedang sebanyak 31 responden (60,8%) dan sebagian kecil kategori ringan sebanyak 20 (39,2%). Terdapat hubungan intensitas nyeri dengan kecemasan pasien osteoarthritis di Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya (p Value 0,042). Berdasarkan hal ini diharapkan pada saat pengkajian nyeri, sebaiknya perawat tidak hanya mengkaji nyeri yang dirasakan pasien, namun juga mengkaji faktor multidimensional nyeri terutama dimensi psikologis. Demikian juga pada saat manajemen nyeri, perawat sebaiknya memperhatikan tingkat stres pasien yang mengalami nyeri kronik agar menghindari timbulnya penyakit lain akibat stres.

Kata kunci : Intensitas Nyeri, Kecemasan, Osteoarthritis
Kepustakaan : 40 (2007 – 2015)

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY TASIKMALAYA
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
GRADUATE BACHELOR OF NURSING PROGRAM
Tasikmalaya, September 2017**

**NURLAILA KODARIAH
C1420113069**

**CORELATION OF PAIN INTENSITY WITH ANXIETY OF
OSTEOARTHRITIS PATIENTS IN URUG COMMUNITY HEALTH
CENTERS TASIKMALAYA**

ABSTRACT

xiii, 76 Pages, VII Chapter, 4 Tables, 2 Chart, 7 Attachments

Osteoarthritis causes the presence of abrasion of the joints and the presence of new irregular bone formation on the joint surface resulting in chronic pain. The old pain causes physical and psychological choking. Psychological disorders caused by chronic pain are mild to severe anxiety. This study aims to determine the relationship of pain intensity with anxiety osteoarthritis patients at Urug community health centers Tasikmalaya. The method used is correlational study method with cross sectional study design. The number of samples is 51 people with consecutive sampling technique. The technique of collecting data is collected directly from respondents using the NPRS and HARS. The results showed the intensity of osteoarthritis patient pain in most of the categories of light 28 (54.9%) and a small category 23 (45.1%). Anxiety of osteoarthritis patients were mostly moderate category 31 respondents (60.8%) and a minority category of 20 (39.2%). There is correlation of pain intensity with anxiety of osteoarthritis patient at Urug community centers Tasikmalaya (p Value 0,042). Based on this expected at the time of assessment of pain, the nurse should not only examine the pain felt by the patient, but also assess the multidimensional factors of pain, especially psychological dimension. Similarly at the time of pain management, nurses should pay attention to the stress levels of patients who experience chronic pain to avoid the incidence of other diseases caused by stress.

Keywords : Intensity of Pain, Anxiety, Osteoarthritis
Libraries : 40 (2007 - 2015)