

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai hubungan lamanya hemodialisa dengan tingkat kecemasan pasien di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lamanya melakukan terapi hemodialisa di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar pada kategori belum lama sebanyak 66 orang (59,5%).
2. Tingkat kecemasan responden yang melakukan terapi hemodialisa di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagian besar pada kategori kecemasan sedang sebanyak 52 orang (46,8%).
3. Ada hubungan lamanya hemodialisa dengan tingkat kecemasan pasien di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan nilai dengan nilai signifikan $pvalue$ sebesar $0,035 < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti lebih mencari informasi dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai terapi hemodialisa dan tingkat kecemasan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Diharapkan pihak Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya menambah kepastakaan atau referensi khususnya tentang hemodialisa dan kecemasan.

3. Bagi Penderita GGK

Diharapkan pasien menceritakan kepada keluarga tentang hal-hal yang dapat menimbulkan rasa cemas ketika terapi hemodialisa sehingga pihak keluarga bisa memberikan bantuan.

4. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan pada pasien hemodialisa dengan menggunakan metode survei.

