

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran sputum sebelum dilakukan batuk efektif pada pasien tuberculosis di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2020, dengan rata-rata 1,86 cc.
2. Pengeluaran sputum sesudah dilakukan batuk efektif pada pasien tuberculosis di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya 2020, dengan rata-rata 2,21 cc.
3. Ada pengaruh batuk efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien Tuberculosis di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya dengan ρ Value $0,009 < \alpha = 0,05$.

B. Saran

1. Bagi Peneliti
Hasil peneliti diharapkan menambah dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh batuk efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien Tuberculosis di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan caturdrama bagi mahasiswa keperawatan yang

berkaitan dengan edukasi tentang pengaruh batuk efektif khususnya dalam pengeluaran sputum.

3. Bagi Profesi Perawat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengetahuan mutu pelayanan asuhan keperawatan khususnya pada tuberculosis dalam pengeluaran sputum.

4. Bagi Puskesmas Cihideung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat perencanaan pelayanan perawatan kesehatan kepada pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam pelaksanaan SOP batuk efektif untuk pengeluaran sputum pada pasien tuberculosis di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan referensi terkait penelitian tuberculosis dan metode yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih memperhatikan kelompok kontrol untuk meminimalisir kebiasaan hasil yang didapat.