

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
LAPORAN TUGAS AKHIR, AGUSTUS 2017

Deti Meilawati
E.15401.14.043

**“Penatalaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk Mengurangi
Kejadian Perdarahan pada Kala IV Persalinan”**

ABSTRAK

xii, 36 halaman, 2 tabel, 4 gambar, 6 lampiran
Perdarahan sampai saat ini menduduki 3 teratas penyebab kematian ibu di Indonesia. Salah satu tindakan yang tepat adalah melakukan IMD. Pada saat dilakukan IMD, sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang dapat merangsang kontraksi uterus sehingga menurunkan risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan. Tujuan asuhan ini untuk mengetahui penatalaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat mengurangi kejadian perdarahan pada kala IV persalinan. Jumlah subjek asuhan pada penelitian ini adalah 5 orang ibu bersalin. Tempat penelitian dilaksanakan di BPM S, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Hasil asuhan menunjukkan bahwa 5 orang ibu bersalin yang dilakukan IMD tidak terjadi perdarahan pada kala IV persalinan. Diharapkan bidan dapat meningkatkan asuhan kebidanan dalam upaya mengurangi kejadian perdarahan kala IV dengan cara menerapkan inisiasi menyusu dini pada pertolongan persalinan.

Kata Kunci : Ibu Bersalin, Inisiasi Menyusu Dini, perdarahan
Referensi: 14 (2008-2017)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
LAPORAN TUGAS AKHIR, AUGUST 2017

Deti Meilawati
E.15401.14.043

“Early Treatment Initiation Suckle (IMD) to Reduce the Incidence of Bleeding During Childbirth IV”

ABSTRACT

xii, 36 pages, 2 tables, 4 images, 6 attachments

Bleeding until today occupy the top 3 causes of maternal death in Indonesia. One of the proper course of action is to do the IMD. At the time done IMD, touch, sycophancy, sweep on the nipple of the mother will stimulate spending hormone oxytocin stimulates uterine contractions can thus lower the risk of bleeding post delivery. The purpose of this orphanage to find out Early treatment Initiation Suckle (IMD) can reduce the incidence of bleeding during childbirth IV. The number of orphanages in the subject of the research is the birthing mother 5. Place the research implemented in BPM S, sub Mangkubumi Tasikmalaya. The results indicate that the orphanages 5 maternity mother done IMD did not occur during hemorrhage IV labor. Expected midwives can improve the care of gynecologist in an attempt to reduce the incidence of bleeding epoch IV with how to implement the initiation of early childbirth aid on the sucking.

Keywords : Birthing mothers, Suckle, bleeding Early Initiation

Bibliography : 14 (2008-2017)