

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN**

Skripsi, Desember 2020

PUTIMA RAINI

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN
MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) DINI
*LITERATUR REVIEW***

ABSTRAK

xiii bagian awal + 88 halaman + 2 bagan + 2 Tabel + 3 lampiran

MPASI dini adalah pemberian makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi <6 bulan. Seharusnya bayi diberi MPASI pada usia 6 bulan, karena bila diberikan pada usia kurang dari 6 bulan akan mengganggu asupan gizi dan pencernaan bayi yang disebabkan oleh banyak faktor. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini berdasarkan *literatur review*. Metode *literatur review* yang digunakan dengan mengakses jurnal melalui *search engine google scholar* dan portal garuda. Didapatkan 12 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Tahapan analisis dilakukan dengan identifikasi, screening, penilaian kualitas dan analisa data menggunakan IMRAD, kemudian menyusun hasil analisis. Hasil didapatkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini adalah pengetahuan, kepercayaan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, pengalaman, sosial budaya, informasi, pendapatan, sikap/perilaku, aktivitas. Faktor yang tidak berhubungan yakni petugas kesehatan, usia, status gizi ibu, paritas, sosial ekonomi. Disarankan bagi profesi perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian MP-ASI > 6 bulan pada masyarakat sehingga dapat menurunkan dan mencegah pemberian MP-ASI dini dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Kata Kunci : Bayi, MPASI Dini,

Kepustakaan : 38 (2010-2020)

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY TASIKMALAYA
FACULTY OF HEALTH SCIENCE
STUDY PROGRAM OF S1 NURSING**

Essay, December 2020

PUTIMA RAINI

**FACTORS RELATED TO EARLY SUPPLEMENT OF ASSOCIATED
FOOD (MPASI)
LITERATURE REVIEW**

ABSTRACT

xiii opening section + 88 pages + 2 charts + 2 tables + 3 appendices

Early complementary feeding is the provision of food or drink given to infants <6 months. Babies should be given complementary foods at the age of 6 months, because if they are given at less than 6 months it will interfere with the baby's nutritional intake and digestion due to many factors. The research objective was to determine the factors associated with early complementary breastfeeding based on literature review. The literature review method used is by accessing journals through the google scholar search engine and the Garuda portal. There were 12 articles that match the inclusion criteria. The analysis stage was carried out by identifying, screening, quality assessment and data analysis using IMRAD, then compiling the results of the analysis. The results show that the factors associated with early complementary feeding are knowledge, belief, job status, education level, experience, socio-culture, information, income, attitudes / behavior, activities. Factors that are not related are health workers, age, maternal nutritional status, parity, socio-economy. It is recommended for the nursing profession to provide health education about complementary breastfeeding > 6 months to the community so that it can reduce and prevent early complementary breastfeeding and increase the success of exclusive breastfeeding.

Keywords: Babies, Early Solids Food,

Bibliography: 38 (2010-2020)