

**PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**

Skripsi, Juni 2024  
Siti Aisah

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN  
BERAT BAYI LAHIR RENDAH (BBLR) DI RUANG PERINATOLOGI  
RSUD DR. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA**

**ABSTRAK**

xii halaman + 61 halaman + 8 tabel + 1 bagan + 10 lampiran

Prevelensi kematian bayi di Indonesia masih tinggi salah satu penyebabnya adalah Berat Bayi Lahir Rendah. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah pada bayi disebabkan oleh berat bayi lahir rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian korelasi dengan pendekatan *retrospektif*. Populasi penelitian ini adalah seluruh bayi yang mengalami Berat Bayi Lahir Rendah di Ruang Perinatologi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dari bulan Januari-Maret 2024 didapatkan sebanyak 76 responden. Data di analisis menggunakan distribusi frekuensi dan *Uji-Chi square*. Hasil penelitian didapatkan faktor usia <20 dan >35 tahun sebanyak 49 responden (64,5%), usia 20-35 tahun 27 responden (35,5%). Faktor paritas grandemultipara sebanyak 56 responden (73,7%), primipara dan multipara sebanyak 20 responden (26,3%). Faktor usia kehamilan <37 minggu sebanyak 58 responden (76,3%), usia kehamilan >37 minggu sebanyak 18 responden (23,7%). Hasil *uji Chi-Square* didapatkan  $p = 0,000 < \alpha 0,05$ . Kesimpulan ada hubungan antara umur ibu, paritas, usia kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah di ruang perinatologi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Disarankan bagi tenaga kesehatan khususnya bagi profesi perawat dan bidan agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil.

Kata Kunci : Berat Bayi Lahir Rendah, BBLR

Daftar Pustaka : 32 (2014-2023)

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY TASIKMALAYA  
FACULTY OF HEALTH SCIENCE  
STUDY PROGRAM STUDY OF NURSING SCIENCE**

*Thesis, June 2024  
Siti Aisah*

**FACTORS RELATED TO THE INCIDENT OF LOW BIRTH WEIGHT  
(LBW) BABIES IN THE PERINATOLOGY ROOM OF DR. SOEKARDJO  
TASIKMALAYA CITY**

**ABSTRACT**

*xii pages + 61 pages + 8 tables + 1 chart + 10 appendices*

*The prevalence of infant deaths in Indonesia is still high, one of the causes is low birth weight. The purpose of this research is to find out the factors associated with the incidence of low birth weight in the RSUD Dr. Soekardjo City of Tasikmalaya. This method of research is to use a type of correlation research with a retrospective approach. The population of this study is the entire baby with low birth weight in the Perinatology Room of RSUD Dr. Soekardjo City of Tasikmalaya from January-March 2024 obtained as many as 76 respondents. Data in analysis uses frequency distribution and test-chi square. The study results obtained age factors <20 and >35 years of 49 respondents (64,5%), age 20-35 years of 27 respondents (35,5%). The grandemultipara parity factor was 56 respondents (73.7%), primipara and multipara 20 respondents (26.3%). Pregnancy age factor <37 weeks of 58 respondents (76.3%), pregnancy life >37 week of 18 respondents (23.7%). The Chi-Square test resulted in  $p = 0,000 < \alpha 0,05$ . The conclusion is that there is a relationship between maternal age, parity, pregnancy age and low birth weight in the perinatology room of RSUD Dr. Soekardjo City of Tasikmalaya. It is recommended for health care professionals in particular for nurses and midwives to improve health care and give advice to pregnant mothers.*

*Keywords : Low Birth Weight Baby, BBLR*

*Literature : 32 (2014-2023)*