

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata penyembuhan luka hari ke 3 Post *Sectio Caesarea* kelompok kontrol di Ruang Melati Lantai 2 RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yaitu 3,22.
2. Rata-rata penyembuhan luka hari ke 3 post *sectio caesarea* kelompok eksperimen di ruang melati lantai 2 RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yaitu 1,44.
3. Perbandingan mobilisasi dini terhadap penyembuhan luka hari ke 3 post operasi *sectio caesarea* di Ruang Melati Lantai 2 RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan p value 0,000.

B. Saran

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan kepustakaan dan bahan kajian dalam bidang keperawatan untuk mobilisasi dini yang bisa dijadikan sebagai alternatif.
2. Bagi Profesi Perawat
Perawat atau petugas kesehatan diharapkan dapat mengembangkan mobilisasi dini dalam menjadi terapi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan khususnya untuk menangani skala nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea*.

3. Bagi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Hasil kajian ini direkomendasikan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas asuhan keperawatan di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya khususnya dengan menjalankan mobilisasi dini sesuai SOP secara konsisten untuk mempercepat penyembuhan luka pada pasien post *sectio caesarea*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka dalam melakukan penelitian mobilisasi dini untuk mempercepat penyembuhan luka post *sectio caesarea* dan juga bisa dijadikan bahan pustaka untuk meneliti pengaruh mobilisasi dini pada kasus-kasus yang lainnya

